


НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПІДОЗРІ НА ГЕМОМРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ



ПЛАН

- ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ІНСУЛЬТ”
- ОЗНАКИ ІНСУЛЬТУ
- ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПІДОЗРІ НА ІНСУЛЬТ
- ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
- ВИСНОВКИ
- СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інсульт — гостре порушення мозкового кровообігу.




Виникає за розриву судини або закупорки її тромбом (кров'яним згустком). У результаті цього ділянка мозку не отримує необхідної кількості крові та кисню. Нервові клітини в цій ділянці мозку гинуть протягом декількох хвилин. При цьому відбувається втрата деяких функцій (рухи, чутливість) у тій ділянці тіла, яку контролює вражена ділянка мозку.




Ознаки інсульту:

- раптова асиметрія або оніміння обличчя;
- раптова слабкість і/або оніміння в руці чи нозі з одного боку;
- раптове порушення мовлення/розуміння простих команд/запитань;
- погіршення зору в одному оці або в обох очах;
- порушення ходи • запаморочення, втрата рівноваги або координації;
- головний біль без наявної причини;
- втрата свідомості (непритомність).



Порядок надання першої медичної допомоги при підозрі на інсульт

1. Терміново викличте бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги і стисло пояснити диспетчеру причину виклику.



2. Покласти хворого, підвести голову та плечі - це зменшить кров'яний тиск у ділянці голови.

3. Якщо постраждалий непритомний, але дихає нормально, перевести його в безпечне положення.



4. Не можна давати людині з підозрою на інсульт нічого їсти та пити - це спровокує порушення прохідності дихальних шляхів (здатність ковтати може бути порушена).





5. Необхідно постійно спостерігати за постраждалим, не залишати його без нагляду.

6. Не дозволяйте постраждалому відмовлятися від виклику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Краще перестрахуватися, ніж недооцінити ситуацію, що склалася.

7. За необхідності будьте готові розпочати серцево-легеневу реанімацію.



Важливі рекомендації

Виявити ознаки інсульту можна наступним чином:

- Попросіть хворого підняти руки - він не зможе підняти одну руку, або підніме її не повністю.
- Попросіть хворого посміхнутися - один кут рота залишиться опущеним. Попросіть хворого вимовити просте речення - він не зможе цього зробити.



Висновки

Геморрагічний інсульт вимагає негайної медичної допомоги, і важливо діяти рішуче та швидко. Важливо надавати домедичну допомогу, але не намагайтеся лікувати цей стан самотійно. Швидка реакція правильні дії можуть збільшити шанси на одужання і зменшити ризик ускладнень.

Список використаної літератури



Дякую за увагу!